



掌握1316原則 讓聽損兒開啟新「聲」聽見美好

文·圖 / 國民健康署

示意圖非當事人

國民健康署自101年起全面補助本國籍新生兒聽力篩檢，篩檢覆蓋率將近99%，居全球領先之列，每年可及早發現7百多名先天性聽力損失兒童。國民健康署呼籲家長務必讓新生兒接受聽力篩檢，若發現異常應掌握「1316原則」，及早確診、介入療育，幫助孩子順利發展語言與學習能力。

我國新生兒聽力篩檢居全球領先之列，覆蓋率近99%

聽力是語言發展的起點，也是孩子探索世界的開端。聽力損失若未及時發現，將嚴重影響語言發展、社交互動及未來學習能力，而新生兒先天性聽力損失，必須透過篩檢才能精準識別。

新生兒聽力篩檢1316原則

1

出生1個月內：完成篩檢
出生後住院期間 / 72小時內

3

出生3個月內：完成確診
確認聽損程度

1

確診後1個月內：選配輔具
助聽器/人工電子耳

6

出生後6個月內：開始療育
建立聽覺語言能力



全球每千名新生兒，大約有3至5名有先天性聽力損失。依據世界衛生組織2024年發布的新生兒篩檢實施指引，全球只有1/3左右國家全面提供新生兒聽力篩檢，我國篩檢覆蓋率自全面推動以來，長期維持在9成以上，近年已接近99%，居全球領先之列。

掌握「1316」黃金期 為聽損兒開啟新「聲」

為及早發現先天性聽力損失與及早進行聽語療育，以把握語言發展關鍵期，讓聽力損失兒童（簡稱聽損兒）不錯失學習成長的關鍵，國民健康署積極推廣「1316原則」，呼籲家長配合醫療團隊落實以下時程：

- **出生「1」個月內篩檢**：新生兒出生後應儘快（最好於住院期間、出生72小時內）完成聽力篩檢，勿因為購買商業保險而延後篩檢。
- **出生「3」個月內確診**：若篩檢未通過，應於新生兒出生後3個月內完成確診檢查，確認聽力損失程度。
- **確診後「1」個月內選配輔具**：確診後1個月內，依醫療專業評估選配適合的助聽器或人工電子耳等輔具。
- 若能在6個月大前介入療育，孩子的語言發展及社會互動能力將可大幅提升，甚至能與同儕同步學習。

善用預防保健及發展篩檢服務 提高警覺、觀察居家行為

有一部分的聽力損失並無法在新生兒階段發現，國民健康署沈靜芬署長提醒家長，即使通過新生兒聽力篩檢，家長仍應善用政府補助未滿7歲兒童，可享有7次兒童預防保

健服務，以及6次兒童發展篩檢服務，按時帶孩子接受服務；若兒童經醫師發現有對聲音反應之異常，或語言發展遲緩情形，可進一步轉介。家長平日也可利用《兒童健康手冊》中的「嬰幼兒聽力簡易居家行為量表」持續觀察，若孩子出現說話不清楚、語言發展遲緩或對呼喚反應遲鈍等徵兆，應儘速就醫，以排除遲發性聽力損失的可能性。

目前全台約有260餘家醫療院所提供「新生兒聽力篩檢服務」，並有超過60家醫院提供確診服務。國民健康署將持續與各醫療機構合作，提供全面的後續療育轉介，讓每個新生命都能掌握新「聲」聽見美好，擁有健康發展的每一步。

嬰幼兒聽力簡易居家行為量表

全頁共1頁

本量表的指標僅供家長參考，並不能取代專業的聽力檢查。除了新生兒聽力篩檢，我們也鼓勵孩子上幼稚園之前先至相關聽力單位進行學前聽力篩檢。若發現任何聽力上的問題，及時治療可避免孩子日後因聽力損失而在生活上有所不便。

出生-2個月大

是、否 1. 是否有通過新生兒聽力篩檢。

是、否 2. 巨大的聲音會使孩子有驚嚇的反應。
(如：用力關門聲、拍手聲)

是、否 3. 洗澡時會被大的說話聲或噪音干擾而扭動身體。

3個月-6個月大

是、否 4. 對著他說話時，他會偶爾發出咿咿語語的聲音或是有眼神的接觸。

是、否 5. 餵奶時，會因哭聲的聲音而停止吸奶。

是、否 6. 笑鬧時，聽見媽媽的聲音會安靜下來。

是、否 7. 會對一些環境中的聲音表現出興趣。
(如：電話聲、狗叫聲、電視聲等)

7個月至-12個月大

是、否 8. 開始牙牙學語，例如ㄇㄚ、ㄅㄚ、ㄆㄚ等，並自得其樂。

是、否 9. 喜歡玩會發出聲音的玩具。

是、否 10. 開始對自己的名字會有回應，並了解「不可以」和「掰掰」的意思。

是、否 11. 當您從背後叫他，他會轉向您或者發出咿咿語語的聲音。

1歲-2歲大

是、否 12. 可以說簡單的單字。(如：爸爸、媽媽)

是、否 13. 可以了解簡單的指示。(如：給我)

是、否 14. 兩歲左右時，能夠重複您所說的話、片語(如：不要、沒有了)，或是短句(如：爸爸去上班)。

以上項目，在您對孩子持續觀察之後，若每個階段的答案為「否」達三項或更多，建議讓您的孩子立即接受聽力檢查。

(本量表由雅文兒童閱讀語文教基主會 整理)

聽力簡易居家行為量表

61